

เตือน ห้ามนำเนื้อโคกระบือที่ป่วยเป็นพิษสุนัขบ้ามากิน หรือชำแหละขายเด็ดขาด

จากกรณีที่มีชาวบ้านในจังหวัดแห่งหนึ่ง ในภาคอีสาน ได้กินเนื้อกระบือที่เจ้าของชำแหละขาย ซึ่งทราบภายหลังว่า กระบือที่ตายนั้นป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ผู้ที่กินเนื้อกระบือเข้าไปมีอาการปวดท้องนั้น สคร.9 ขอเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และเตือนเจ้าของสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย หากมีอาการป่วยผิดปกติและตายลง ห้ามนำเนื้อมากินหรือชำแหละขายเด็ดขาด หากพบสัตว์เลี้ยงที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า คือมีอาการทางตา เดินโซเซ น้ำลายหยอ หยอ ลิ้นห้อย ตาขวาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันที ห้ามเคลื่อนย้ายหรือชำแหละสัตว์

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคพิษสุนัขบ้าว่า โรคพิษสุนัขบ้าเกิดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว โค กระบือ โรคนี้ติดต่อกันได้โดยเมื่อถูกกัด ข่วน หรือน้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือบาดแผลตามร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยเบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว มีไข้ ชั่ว ปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกกัด ต่อมาจะมีอาการกระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลืนน้ำ และกลืนเนื้อขากระตุก แขนงหน้าอก หายใจไม่ออก หรืออาจชัก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวต่อไปว่า โรคนี้หากเกิดขึ้นในโค กระบือ ห้ามนำเนื้อสัตว์นั้นมากินหรือชำแหละขายอย่างเด็ดขาด เนื่องจากในขณะที่ชำแหละนั้นไม่ได้ป้องกันตนเอง อาจทำให้เกิดบาดแผลและติดเชื้อได้ ผู้ที่นำเนื้อสัตว์มาปรุงเป็นอาหารต้องปรุงให้สุกทุกครั้ง ห้ามรับประทานแบบดิบๆ เนื่องจากอาจไม่ทราบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ว่าเป็นสัตว์ที่ป่วยตายหรือไม่ ดังนั้นต้องป้องกันตนเองไว้ก่อน หากถูกสุนัขหรือแมวกัด หรือข่วนให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน และเน้นย้ำให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างเหมาะสม ร่วมกับกักขังสัตว์ที่กัดสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หากสัตว์ตัวนั้นมีอาการปกติแสดงว่าไม่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า แต่หากเสียชีวิต รีบแจ้งกรมปศุสัตว์ หรือเจ้าพนักงานสัตวบาลว่า “ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หามอ ฉีดต่อจนครบ”

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่